

# ボツリヌストキシン治療 同意書

## ボツリヌストキシン治療について

ボツリヌストキシン治療は、ボツリヌス菌から産生される「ボツリヌストキシン」の筋肉の働きを抑制する作用を利用した治療です。

## 効果

- ・しわの抑制作用
- ・筋肉を小さくする作用（エラへの注入による小顔効果、ふくらはぎへの注入による縮小効果など）
- ・汗の抑制効果

## 作用期間

しわの抑制、汗の抑制作用は、通常投与後2、3日で発現します。

筋肉の縮小効果は、通常投薬後1ヶ月を過ぎた頃から実感され始めます。

ボツリヌストキシン治療の作用期間は3、4ヶ月ですので、効果が薄れるこの時期に次の投与を行うことが推奨されます。まれにボツリヌストキシンに対する抗体をお持ちの場合（1000人に1~2人くらいの場合）、効果の減弱や作用期間の短縮などが認められます。

## 副作用、合併症

- ・注射針による内出血
- ・筋肉の収縮抑制に伴う違和感、筋肉の減弱作用  
顔・目尻・眉間・頭が重く感じたり、眉毛が上がりにくくなるので、一時的にまぶたが重く感じる場合があります。表情筋に作用するため、表情がいつもと違って見える場合もございます。一度注入されますと効果が切れるまで、（約3~6ヶ月くらい）元に戻す処置はございませんが、時間と共に必ずもとの表情に戻りますのでご安心ください。
- ・ごくまれに発熱、吐き気、頭痛（約0.5%）

## 注意事項

- ・妊娠中、授乳中の方への投与はできません。
- ・基礎疾患をお持ちの方は、事前に担当医にお伝え下さい。

※ボツリヌストキシン治療後、3ヶ月以内の妊娠は避けてください。

## 同意書

説明内容を理解いたしましたので、治療を受けることに同意します。

\_\_\_\_\_年 月 日

お名前 \_\_\_\_\_

生年月日 \_\_\_\_\_ 平成 \_\_\_\_\_ 年 月 日

◎未成年の場合、保護者の方サインをお願いいたします。

お名前 \_\_\_\_\_ 印 \_\_\_\_\_ 続柄 \_\_\_\_\_